



INDICADORES DE QUE PODRÍA SER ÚTIL UNA EVALUACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA MI NIÑO
PEQUEÑO (2 A 3 AÑOS)

- Su tono muscular es bajo: parece débil o blandito
- Logra los hitos del desarrollo más tarde que otros niños de su edad
- Evita tumbarse boca abajo; se molesta cuando se lo pone boca abajo
- Está siempre en movimiento o sólo quiere participar en actividades sedentarias
- Le molesta que lo bañen, le laven el pelo, le cepillen los dientes o el pelo.
- Tiene pataletas frecuentemente; es difícil de consolar; altamente quisquilloso
- Se frustra fácilmente
- Su expresión verbal es limitada (menos de 50 palabras a los 2 años de edad), es difícil entenderlo
- Le cuesta mantener contacto ocular con otras personas
- Le cuesta vestirse y desvestirse
- Prefiere ir desnudo o sólo con mangas largas. Le molestan etiquetas de la ropa y ciertas telas
- Tiene una dieta limitada: sólo come alimentos de ciertas texturas, sabores o temperatura
- Le cuesta soplar, masticar, chupar
- Se resiste a que lo sostengan en brazos o se pone tenso o ansioso cuando lo abrazan
- Se pone nervioso en ambientes muy activos o bullicios (p. ej., fiestas de cumpleaños)
- Evita las actividades de motricidad fina o de motricidad gruesa, o realiza sólo unas pocas en cada categoría
- No muestra interés por las actividades de la vida diaria (desvestirse, ponerse algunas prendas, usar cubiertos para comer)
- Las transiciones entre actividades o lugares le resultan difíciles